



- Es la enfermedad más común de transmisión sexual en el mundo.
- Existen distintos tipos de vph, las infecciones suelen desaparecer pero algunos genotipos pueden persistir y convertirse en cáncer (CCU, vagina, vulva, pene, ano, orofaringe).
- Más del 70% de los cánceres cervicales de útero (CCU), 4º cáncer más frecuente en la mujer a nivel mundial, contiene el virus del papiloma humano.
- Más de 2.000 mujeres mueren en España al año por CCU, más de 4.000 en EEUU, y un total de más 250.000 a nivel global.

VPH



- **PREVENCIÓN:** preservativo (60%-70% eficacia), vacunación (sólo frente cuatro genotipos) y revisiones (citología y Papanicolaou).
- Población 18-25 años con mayor incidencia de infección por el VPH (29%)
- Ausencia alta de hombres vacunados
- Gran desconocimiento de los jóvenes del VPH

Objetivos

Evaluar el nivel de conocimiento y prevención de los jóvenes menores de 25 años sobre el VPH, su actitud hacia las revisiones o sobre hablar del VPH

mejorar las intervenciones enfocadas a la comprensión, a la normalización y a la prevención de la enfermedad.

Método

- ***Diseño***

Descriptivo transversal

- ***Participantes***

114 estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M) de entre 18 a 23 años (75% mujeres)

- ***Procedimiento e instrumentos:***

Cuestionario 15 preguntas (Murphy et al., 2011; Murphy et al., 2013) sobre conocimiento y actitud sobre el VPH

Resultados

Conocimiento estar vacunado

- Las mitad de los jóvenes (52%; n=59) dijo estar vacunado.
- Alto desconocimiento (25%)
- 62% mujeres vacunadas / 14% hombres vacunados.

Resultados


Conocimiento sobre el VPH

	CORRECTO (%)	INCORRECTO (%)
Qué es el VPH	65 (57%)	49 (43%)
Formas de contagio	72 (63%)	42 (37%)
A quién afecta	39 (34%)	75 (66%)
Detección del VPH	26 (23%)	88 (77%)
Síntomas visibles	17 (15%)	97 (85%)
Prevención	81 (71%)	33 (29%)
Relación con cáncer de cuello de útero	24 (21%)	90 (79%)
Papanicolaou	2 (2%)	112 (98%)

?

Resultados

Hablar sobre el VPH



Resultados

Importancia de revisiones

- *Sólo el 17% piensa que son importantes*

Percepción sobre tener VPH

- Para el 43% de los jóvenes (n= 49) es embarazoso o fuertemente embarazoso que sepan que tienen el VPH
- importante o fuertemente importante tener apoyo de su entorno (83%; n= 95)

Discusión

- Desconocimiento de los jóvenes españoles sobre si están vacunados o no contra el VPH
- Bajo número de hombres vacunados
- Vergüenza de hablar del VPH con la familia
- Importancia y riesgo de los *peers*

Discusión

- Poco conocimiento de los jóvenes españoles sobre el VPH (contagio, síntomas, pruebas y relación CCU)
- Prevención: preservativo y vacuna
- Baja importancia a las revisiones
- Vergüenza en caso de padecer el VPH

Conclusiones

- Ofrecer vacunas para los niños
- Complementar campañas de vacunación con campañas informativas
- Incentivar la comunicación sobre educación sexual entre padres-jóvenes
- Necesidad intervenciones informativas dirigidas a jóvenes
- Campañas concienciación revisiones
- Intervenciones que ayuden a la comprensión y normalización del VPH y de aquellos afectados/as por el virus.